


## FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL



- 1) angico-vermelho
- 2) grápia
- 3) gravatá
- 4) camboatá
- 5) pau-marfim
- 6) cedro


Originalmente a Floresta Estacional Decidual estendia-se por toda a bacia do rio Uruguai. Durante o período frio e seco 50% das árvores perdem suas folhas.



## FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

# IRARA

*Eira barbara*



**Distribuição geográfica:** está nas Américas, desde o México até a Argentina. No Brasil ocorre em todos os biomas. Em Santa Catarina também pode ser encontrada na Floresta Ombrófila Densa e Mista.

**Atividade:** é mais ativa durante a noite e no período crepuscular. Possui hábito escansorial (vive tanto no alto das árvores como no chão) e é solitária.

**Tamanho:** cerca de 60 cm de comprimento, não incluindo a cauda.

**Peso:** quando adulta, cerca de 10 kg.

**O que come:** é carnívora, mas alimenta-se também de frutos, podendo engolir as sementes sem mastigá-las. Assim, a irara é considerada um animal capaz de dispersar sementes e contribuir para a propagação das árvores numa floresta. É também conhecida pelo nome de papamel, por gostar de mel.

**Reprodução:** a fêmea busca um local protegido, como uma árvore oca e dá a luz de 2 a 3 filhotes, que nascem após 63 a 70 dias de gestação.



**Apresenta grande variabilidade na coloração. Pode ser marrom-escuro com a cabeça clara ou ser bege-clara.**

**Está em perigo? Não.**

## FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

# LONTRA

*Lontra longicaudis*



**Distribuição geográfica:** países da América Central e América do Sul. Ela está em quase todo o território brasileiro, exceto nas regiões mais secas do Nordeste. Em Santa Catarina também pode ser encontrada na Floresta Ombrófila Densa e Mista.

**Atividade:** é predominantemente crepuscular e noturna, quando vai para água buscar o alimento. Durante o dia dorme entre pedras ou ocos de árvores próximos aos rios.

**Peso:** até 14 kg.

**Tamanho:** até 130 cm de comprimento.

**O que come:** é carnívora e alimenta-se de peixes, crustáceos, anfíbios, répteis, às vezes de aves e mamíferos pequenos.

**Reprodução:** a gestação dura cerca de 60 dias e a fêmea dá a luz de 1 a 6 filhotes. Fica adulta ao completar 2 anos. Em cativeiro pode chegar a 25 anos.



Ela nada bem porque possui membranas que interligam os dedos e pelo formato comprido e largo de sua cauda.

**Está em perigo?** Sim, o número de lontras está diminuindo em função da poluição das águas e da retirada da vegetação das margens dos rios. Isso faz com que ela não encontre alimento e locais para construir sua toca.





FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

## JACUAÇU

*Penelope obscura*



**Distribuição geográfica:** é encontrada nas regiões limítrofes com o Brasil, como no Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil ocorre ao longo da faixa leste a partir de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, está disperso na Floresta Ombrófila Densa e Mista.

**Atividade:** Pode ser observado sozinho, em par ou em bandos de 10 a 15 indivíduos.

**Peso:** em torno de 1,2 kg.



**Tamanho:** é uma ave relativamente grande, com 75 cm de comprimento.

**O que come:** grande diversidade de frutos. É dispersor do palmito, pois engole o fruto desta palmeira e, através das fezes, as sementes caem em vários locais da floresta.

**Reprodução:** são monogâmicos. O casal constrói um ninho no alto das árvores, muitas vezes entre um emaranhado de cipós ou num galho com bromélias. Nele a fêmea deposita 3 ovos. O período de incubação dura 28 dias. Os filhotes são cuidados pelo casal.



**Fazem um alto chamado de manhã cedo e no final da tarde.**


**Está em perigo?** Sim, o desmatamento e a caça indiscriminada estão ocasionando a diminuição da população desta espécie.



FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

## MARIA-FACEIRA

*Syrigma sibilatrix*



### Distribuição geográfica:

ocorre na Venezuela, Colômbia, Paraguai, Bolívia e Argentina. É encontrada desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também está na Floresta Ombrófila Densa e Mista e na Restinga.

**Atividade:** é diurna. Passa a noite pou-sada em árvores altas.

**Tamanho:** mede 53 cm.

**Peso:** cerca de 0,54 kg.

**O que come:** passa a maior parte do tempo no solo, andando a procura de insetos. Em banhados e margens de rios, fica sempre nas partes rasas e com vegetação. Lá se alimenta de insetos, anfíbios e peixes como o muçum que habita águas barrentas. É uma das primeiras aves a aparecer após a terra ser arada, onde captura minhocas e outros invertebrados.

**Reprodução:** constrói o ninho com gravetos, dispostos de forma pouco organizada, no alto das árvores.




**Pode ser observada sozinha ou em par. É territorial e sempre retorna ao local de alimentação.**

**Está em perigo? Não.**

## FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

# CURICACA

*Theristicus caudatus*



### Distribuição geográfica:

ocorre em todo o país e em grande parte da América do sul, naqueles países próximos ao Brasil. Prefere áreas mais abertas, com vegetação mais esparsa. Em Santa Catarina também pode ser encontrada na Floresta Ombrófila Mista e nos Campos de Altitude.

**Tamanho:** com bico longo, mede cerca de 70 cm de comprimento e 43 cm de altura.

**Peso:** aproximadamente 1 kg.

**O que come:** vai ao solo, onde alimenta-se de pequenos animais, como gafanhotos, aranhas, centopéias, lagartixas e cobras. Em uma terra mais fofo enterra todo o bico e consegue capturar larvas de besouro e de outros insetos.

**Reprodução:** constrói um ninho feito de gravetos e nele a fêmea deposita cerca de 5 ovos. A incubação dura entre 20 e 25 dias e o casal reveza-se para cuidar dos filhotes, que são alimentados por regurgitação. A nidificação é colonial, isto é, durante a época reprodutiva, numa mesma árvore pode haver ninhos de diversos casais.



**É uma ave de hábito gregário, ou seja, vive em grupo.**


**Está em perigo? Não.**



FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

## CÁGADO-RAJADO

*Phrynops williamsi*



**Distribuição geográfica:** está disperso no Uruguai, Argentina, Paraguai e nos três estados do sul do Brasil, onde pode ser encontrado nos rios e em suas margens. Em Santa Catarina também está na Floresta Ombrófila Densa e Mista.

**Atividade:** passa parte do dia nas margens dos lagos e rios, tomando sol para se aquecer e manter a temperatura do corpo.

**Tamanho:** a carapaça tem cerca de 30 cm.

**Peso:** em torno de 3 kg.



**O que come:** invertebrados aquáticos como larvas de insetos, pequenos crustáceos, peixes, algas, sementes.

**Reprodução:** a fêmea deposita em média 8 ovos. Ela constrói o ninho numa área mais afastada da margem do rio ou lago, cavando com as patas posteriores. Em seguida ela põe os ovos no interior da cova, que são cobertos com terra e serrapilheira (folhas secas do solo da floresta). Após a eclosão dos ovos, os filhotes vão para água.



**Dois faixas negras formam um desenho de ferradura em cada face. A carapaça é ovalada e coberta com linhas finas.**

**Está em perigo?** Sim, sua maior ameaça é a poluição dos rios e a inundação de grandes áreas para formação de hidrelétricas.